Crouchen negre = Morenoa

Vass3R08s061-065






Collection Vassal-Montpellier

324Mtp47

~~XI 19 A4~~
Crouchen Negre
=
Morenoa
Clos 3 Rg 8 s 61-65

XI. 19 A4

Crouchen nègre: Morenoa








01
v4



DESIGNATION Crouchen negre = Morenoa

CLOS XI PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 22-9-69 +5

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P 11 : L - M - C

BAIE / TG - G - M - P 14

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 6
s 2 0 avec pépins - apyrène
s 3 7 JUS : inc. - coloré
s 4 0
s 5 0

DESIGNATION Crouchen negre = moren

CLOS XI PLANCHE 19 RANG A souche 4

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : 10.8.70

Date de Maturité : 14.9.70 +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 13 - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 12x13

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 avec pépins - apyrène.
s3 JUS : inc. - coloré.
s4
s5

DESIGNATION Crouchen negre = Morenoa

CLOS XI PLANCHE 19 RANG A souche 4

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8-71 X

Date de Maturité : 7.9.71 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 11 : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 14

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 22
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 0

Année / 1968

Emplacement ...XI...19.A4..... Désignation .Crouchen.negra = Morenoa

	Nombre total	DATES					
		25.3					
1	3	1					
2	f						
3	2	2 x					
4	f						
5	f						

D le 25-3-68 x +1

Ann.e : 1969

Emplacement ...XI 19AG.... Désignation Crouchen..negra :..Morenoa

	Nombre total	DATES							
		22.3.							
1	4	3							
2 fable									
3	2	2		D. le 22-3-69 -1					
4 } fables									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Année : 1970

Emplacement ......XI 18 A 4.... Désignation Crouchen negre = Morenoa

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		26.3	31.3	3-4			
1re	6	0	1	2			
2	6						
3	4	2	3	3 ^			
4	1						
5	1						

Dé 3.4.70 +7

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

3521

Année :2010 Observateur :
Code cépage : 324Mtp47 NomVar : Cabernet franc
Nom introduction :Crouchen negre = Morenoa Emplacement :Vass3R08s061-065

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappes/10 yeux)
1	~~f~~ recepée (2)		(30/3)		
2	2	(1b gr) 30/3	2/4		
3	~~f (2)~~		~~(24/3)~~		
4	f. planté 2010		\	\	\
5	f planté 2010		\	\	\
Moyenne			31/3		

+2

Date de début	**floraison** moitié (oiv 302)	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date de** début	**véraison** moitié (oiv 303)	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)
			26/07	2/08	10/9	

+2 +2

R

Désignation : Crouchen negre = Morenoa

Emplacement : XI 19 A 4 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) légt -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) légt - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation : Crouchen Negre = Morenoa.
Emplacement : XI 19 A 4 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.) 6e

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - 4e cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Désignation :
Emplacement : XI 19A40.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation : Crouchen nègre : Morenoa
Emplacement : XI 19A4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Morenoa

Emplacement :

Désignation : XI 19A 4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 15 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé (6) lég. - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) lég. - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (-) lég. - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (0) - difficile 2.

-Calvo 69

DENOMINATION : Crouche negre = Morenoa
EMPLACEMENT : XI 19A4A.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), le plus souvent elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : 032447 Désignation : Crouchen Nègre ou Morenoa = Cabernet franc.

Origine :

Emplacement : XI 19 A4

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8)
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 69